


四大要點

種出漂亮蘭 石斛



一般來說，其種類可分稱為春石斛及秋石斛。秋石斛是一莖而生，其花枝開在莖的頂端，秋季開花，一梗開花有十數朵，花形約像蝴蝶蘭。春石斛，花莖多在莖部旁抽生，一莖可多次在不同位置開花，花期多在春或夏季，顏色鮮艷，花期可長達一個月或以上，但也可短至一星期。

種植石斛方法主要分為兩大生長期：

1. 春、夏季一即活躍生長期，春季是新芽生長成嫩葉的時期。夏天是新芽逐漸長大的充實階段。故此，必須給予通風良好及遮陽光30%的場地放置。澆水方面需要保持濕潤，尤其在陽光猛烈日子，更須要早晚澆水或將整盆放置在小水盆中。肥料則每月兩次施薄肥。

2. 秋、冬季一秋天後球莖已生長肥大，仍然保持充足陽光，不需遮光。澆水減至三至四天一次。為了促進開花，可施用鉀肥。冬天後，夜間溫度可低至八度，但不得超過十五度。同時再減少

● *Dendrobium thyrsiflorum*
泰國和緬甸



● *Dendrobium amabile*
越南和泰國



斛蘭的必須要素。

射及空氣流通是絕大部份石斛蘭的必須要素。石斛蘭的必須要素。

● Dendrobium lowii 產於汶萊及印尼

石斛蘭(Dendrobium)又稱「樹上的生命」，全球共約有1,600種原生種，大致分有10個屬類。主要原生品種發現在汶萊，新幾內亞，澳洲，新西蘭，大溪地，中國，及北至日本，韓國等地。至於交配種類繁多，達至萬種。在中國本土亦有不少原生品種生長。除了觀賞價值外，也有用作藥用的價值。例如：「霍山石斛」已被廣泛使用。因為原生地域氣候不同，故此，不同品種所需條件如：溫度、濕度都要求不同，但長時間陽光照射及空氣流通是絕大部份石



澆水，由一星至十天一次，只在葉面噴水，令花芽生長。

石斛蘭原生種(即未有跟其它品種交配)。可大概分類如下：

秋石斛(又稱蝴蝶石斛)：多數生長溫度溫暖，最低溫度15°C，品種如下：Den. bigibbum，Den. williamianum。

春石斛：可分為多個屬類—

1.牛角石斛—全年需要高溫，多光，濕度及水份中度，最低溫度15°C。植株可高達150cm，花瓣型呈扭狀，花期可長達1—2月，種類如：Den. stratiotes，Den. stebloceras。

2.黑毛或銀毛石斛—需中至高溫，強光，潮濕，但冬季減少澆水，花期有長達一個月，也有短至2星期。種類如：Den. cruentum，Den. lowii，Den. senile。

3. "Latouria" 屬—需要中至高溫，強光；濕度及水份則要中至高，最低溫度可至13°C，花多為黃色或綠色，花期很長，可達1—2個月。種類

如：Den. alexaudrae，Den. spectabile，Den. macrophyllum.


4. "Pedilonum"

屬一生長期需要高溫，強光；濕度及水份充足。冬季需稍乾及溫度低至13°C，直至開始落葉後才長花芽。花期約一星期，顏色多為紫粉紅，或紅。種類：Den. miyakai，Den. smilliae。

此外，還有多種屬類石斛，如：Den. chrysotoxum，Den. densiflorum，Den. anosmum，Den. parishii。都需要在生長期有充足陽光，中至高溫度，充足澆水，但在秋冬季減少水份，晚間低溫度，(可低至7°C)，令花芽抽生。

因為石斛蘭種類多不勝數，不能盡錄，但總括而言，種植石斛蘭成功，令其健康開花，必須條件是：陽光，溫度及濕度控制，加上最重要是空氣流通。具備以上條件，必定成功在望。■

● Den. chrysotoxum
產於泰國，柬埔寨，
越南一帶



多倫多蘭藝會於本年四月十一至十二日假座2330 Midland Ave華誥處舉辦第十四屆蘭展，歡迎參觀，詳請及入場優待券可上網址 www.taoa.info 瀏覽及下載